(cc) BY

Бойко Юрий Павлович
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой
Лаврова Джульетта Ивановна
д-р мед. наук, профессор
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России
г. Москва

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

***Аннотация**: в данной статье проведен анализ заболеваемости детей и подростков психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, вследствие алкоголизма, наркомании, токсикомании. Отмечено, что, несмотря на снижение анализируемых показателей, данная проблема требует дальнейшего решения.*

***Ключевые слова**: дети, подростки, алкоголизм, наркомания, токсикомания.*

Одной из глобальных целей ВОЗ является сокращение вредного употребления алкоголя, по меньшей мере, на 10% к 2025 г. в связи с тем, что употребление алкоголя стало причиной около 5,9% смертей в мире и 5,1 лет жизни с инвалидностью в 2012 г [1].

В большей мере эта ситуация касается детей и подростов. Специалистами отмечены [2] тенденции к росту показателей общей и первичной заболеваемости психическими расстройствами у детей, подростков, что свидетельствует о первоочередной необходимости совершенствования системы детской и подростковой психиатрической помощи.

Анализ заболеваемости детей и подростков психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных ве-

ществ, проведен за период 2000–2014 гг. по данным официальной Государственной статистики; анализировались абсолютные показатели и в расчете на 100 тысяч детей и подростков. Исследование сплошное.

Всего в 2000 г. было взято под наблюдение детей в возрасте 0–14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, 593 человека, в 2014 году их число составило 85 человек (уменьшилось в 7 раз), в том числе вследствие алкоголизма от 50 человек в 2000 г. до 7 человек в 2014 г. (в 7,1 раза), наркомании – от 216 человек в 2000 г. до 17 человек в 2014 г. (в 12,7 раза), токсикомании – от 327 человек в 2000 г. до 61 человека в 2014 г. (в 5,4 раза), что свидетельствует о резком уменьшении числа детей, которым впервые в жизни был установлен диагноз психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Анализ этих же показателей на 100 тысяч детского населения за анализируемый период (2000–2014 гг.) также свидетельствует об их снижении: вследствие алкоголизма в 6,7 раза (от 0,2 до 0,03), наркомании – в 11,9 раза (от 0,83 до 0,07), при токсикомании – в 4,3 раза (от 1,3 до 0,3).

Численности детей, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях за исследуемый период, уменьшился в 9,7 раза (от 1882 человек в 2000 г. до 194 человек в 2014 г.), в том числе при алкоголизме – в 5,9 раза (от 77 человек до 13 человек), при наркомании – в 15,8 раза (от 317 человек до 20 человек), при токсикомании – в 9,4 раза (от 1488 человек до 161 человека).

Эти же данные в расчете на 100 тысяч детей также характеризовались уменьшением: при алкоголизме в 3 раза (от 0,3 до 0,1), при наркомании – в 12 раз (от 1,2 до 0,1), при токсикомании – в 8,3 раза (от 5,8 до 0,7).

Численность детей, состоящих на профилактическом учете в связи с употреблением с вредными последствиями алкоголя уменьшилась за анализируемый период незначительно, всего в 1,5 раза (от 7032 человек до 4679 человек); вследствие употребления наркотических веществ – в 2,1 раза (от 1352 человек до 631 человека); вследствие употребления ненаркотических веществ – в 1,8 раза (от 3984 человек до 2196 человек). В расчете на 100 тысяч детей эти показатели также уменьшились: вследствие употребления алкоголя в 1,4 раза (от 27,5 до

19,2), употребления наркотических веществ – в 2,0 раза (от 5,3 до 2,6), употребления ненаркотических веществ – в 1,7 раза (от 15,6 до 9,0).

Таким образом, среди детей в возрасте 0–14 лет за анализируемый период отмечается резкое снижение и числа больных, и показателей на 100 тысяч детей, характеризующих как число взятых под наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом, так и численности состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях.

Среди подростков 15–17 лет в 2000 г. было взято под наблюдение с диагнозом, установленным впервые в жизни, 7386 человек, к 2014 году их число уменьшилось до 649 человек (в 12,4 раза), в том числе вследствие алкоголизма и алкогольных психозов от 759 человек до 134 человек (в 5,7 раза), наркомании – от 6122 человек до 309 человек (в 19,8 раза), токсикомании – от 505 человек до 206 человека (в 2,4 раза), что свидетельствует о резком снижении числа подростков, которым впервые в жизни был установлен диагноз психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Анализ этих же показателей на 100 тысяч подросткового населения также свидетельствует об их уменьшении: вследствие алкоголизма в 3,1 раза (от 10,2 до 3,3), наркомании – в 10,6 раза (от 81,8 до 7,7), при токсикомании – в 1,3 раза (от 6,8. до 5,1).

Численность подростков, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях за исследуемый период уменьшился в 6,1 раза (от 10722 человек в 2000 г. до 1751 человека в 2014 г.), в том числе при алкоголизме в 4,0 раза (от 1312 человек до 331 человек), при наркомании – в 16,4 раза (от 9062 человек до 552 человек), при токсикомании – в 4,0 раза (от 3482 человек до 868 человек).

Эти же данные в расчете на 100 тысяч подростков также характеризовались уменьшением: при алкоголизме в 2,1 раза (от 17,5 до 8,3), при наркомании – в 8,7 раза (от 120,7 до 13,9), при токсикомании – в 2,1 раза (от 46,4 до 21,9).

Численность подростков, состоящих на профилактическом учете в связи с употреблением с вредными последствиями алкоголя уменьшилась за анализируемый период незначительно, всего в 1,8 раза (от 59,4 тыс. человек до 32,1 тыс.

человек); вследствие употребления наркотических веществ – в 2,4 раза (от 16,0 тыс. человек до 6,7 тыс. человек); вследствие употребления ненаркотических веществ – в 1,9 раза (от 8,8 тыс. человек до 4,7 тыс. человек). В расчете на 100 тысяч подростков эти показатели вследствие употребления алкоголя увеличились на 2,4% (от 791,1 до 810,4), вследствие употребления ненаркотических веществ – увеличились на 1,5% (от 117,6 до 119,4) и уменьшились вследствие употребления наркотических веществ – в 1,2 раза (от 212,8 до 169,7).

Кроме того, численность подростков, взятых на профилактический учет в связи с употреблением с вредными последствиями алкоголя, уменьшилось в 1,9 раза (от 35,3 тыс. человек до 18,5 тыс. человек), вследствие употребления наркотических веществ – в 2,2 раза (от 11,0 тыс. человек до 4,9 тыс. человек), вследствие употребления ненаркотических веществ в 1,2 раза (от 2,6 тыс. человек до 2,1 тыс. человек). В расчете на 100 тыс. подростков эти показатели также характеризовались небольшим снижением: вследствие употребления алкоголя на 2,0% (от 471,9 до 462,6), употребления наркотических веществ – на 16,4% (от 147,1 до 122,9) и увеличением вследствие ненаркотических веществ – на 53,2% (от 34,8 до 53,3).

Таким образом, среди подростков число больных и показатели на 100 тыс. населения были на порядок выше, чем у детей; ряд показателей характеризовался увеличением, что характеризует ситуацию с подростками как более опасную и требующую усиленного внимания.

Список литературы

1. ВОЗ: доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире. – 2014.

2. Чуркин А.А. Распространенность психических расстройств в населении РФ в 2011 г. / А.А. Чуркин [и др.]. – М., 2014. – 43 с.