

Лаврова Джульетта Ивановна

д-р мед. наук, профессор

Бойко Юрий Павлович

д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного

профессионального образования» Минздрава России

г. Москва

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЗА 1999–2015 ГГ. В РОССИИ

***Аннотация:** в статье отмечается, что за многолетний период наблюдения произошло резкое снижение числа заболевших сифилисом и гонококковой инфекцией среди взрослого и детского населения в России. Авторы объясняют это явление повышением выявляемости заболеваний и эффективностью лечения больных.*

***Ключевые слова:** заболеваемость, сифилис, гонококковая инфекция, взрослое население, детское население.*

По данным ВОЗ [1]: ежедневно более одного миллиона человек приобретают инфекцию, передаваемую половым путем (ИППП); ежегодно 357 миллионов человек приобретают одну из четырех ИППП – хламидиоз, гонорею, сифилис или трихомониаз. Большинство ИППП протекают бессимптомно или только с незначительными симптомами, и по этой причине ИППП может оставаться нераспознанной. Более 900 000 беременных женщин были инфицированы сифилисом, что привело примерно к 350 000 случаев смерти плода и новорожденного в 2012 году. Лекарственная устойчивость, в частности гонореи, представляет значительную угрозу для уменьшения воздействия ИППП во всем мире.

В работе проведен анализ показателей заболеваемости вследствие инфекций, передаваемых половым путем (сифилис и гонококковая инфекция) за 1999–2015 гг. у взрослого и детского населения в России (абсолютные данные

и показатель на 100 тысяч соответствующего населения) по данным официальной государственной статистики [2]. Исследование сплошное.

Абсолютное число больных всеми формами сифилиса среди взрослого населения за анализируемый период уменьшилось в 7,9 раза (от 271699 человек в 1999 г. до 34426 человек в 2015 г.). Показатель заболеваемости сифилисом на 100 тысяч взрослого населения также уменьшился в 8 раз (от 187,2 в 1999 г. до 23,5 в 2015 г.).

Распределение больных по территориальному признаку (федеральные округа) показало, что за период 2014–2015 гг. произошло увеличение числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом сифилиса в ЦФО РФ на 16,2% (от 79441 человека в 2014 г. до 9224 человек в 2015 г.), в ЮФО – на 2,1% (от 2547 человек до 2601 человек), С-КФО – на 1,3% (от 1189 человек до 1204 человек), УФО – на 1,0% (от 2578 человек до 2603 человек), Крымском ФО – на 2,7% (от 188 человек до 1963 человек); в остальных федеральных округах число вновь выявленных больных уменьшилось.

Среди детей в возрасте от 0 до 17 лет за последние 2 года также отмечается уменьшение числа заболевших на 29,6% (от 879 человек в 2014 г. до 619 человек в 2015 г.), а также уменьшение показателя на 100 тысяч детского населения на 29,0% (от 3,1 до 2,2). У детей в возрасте 0–14 лет число больных с впервые в жизни установленным диагнозом за период 2005–2015 гг. также уменьшилось на 77,5% (от 1015 человек в 2005 г. до 228 человек в 2015 г.), а показатель на 100 тыс. анализируемого населения также уменьшился на 80,8% (от 4,7 тысяч человек до 0,9 тысяч человек). У детей в возрасте 15–17 лет за указанный период отмечались те же тенденции – снижение общего числа первично заболевших в 10,7 раза (от 4,3 тысяч человек в 2005 г. до 0,4 тысяч человек в 2015 г.) и показателя на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 6,2 раза (от 61,6 до 9,9).

Численность пациентов с сифилисом среди взрослого населения, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, уменьшилось на 53,0% (от

384,9 тысяч человек в 2000 г. до 180,7 тысяч человек в 2014 г.), а также уменьшился показатель на 100 тысяч взросло населения на 52,8% (от 261,7 в 2000 г. до 123,5 в 2014 г.).

Среди больных сифилисом с впервые в жизни установленным диагнозом число мужчин за анализируемый период уменьшилось в 6,2 раза (от 119851 человек в 2000 г. до 19424 человек в 2014 г.), в том числе на 100 тысяч мужского населения в 7,1 раза (от 176,2 до 24,8); а женщин – в 7,0 раз (от 119540 человек в 2000 г. до 17182 человек в 2014 г.) в том числе на 100 тысяч женского населения – в 6,1 раза (от 154,2 до 25,4).

Среди мужчин больные в возрасте 0–14 лет в 2014 г. составляли 0,6%, 15–17 лет – 0,9%, 18–29 лет – 31,3%, 30–39 лет – 31,0%, 40 и более лет – 36,2%. Среди женщин в 2014 г. больных в возрасте 0–14 лет было 0,8%, 15–17 лет – 2,6%, 18–29 лет – 38,6%, 30–39 лет – 30,2%, 40 лет и старше – 27,8%.

Таким образом, за анализируемый многолетний период произошло значительное уменьшение больных сифилисов среди взрослого и детского населения, как с впервые установленным диагнозом, так и состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях

Число больных вследствие гонококковой инфекции среди взрослого населения за анализируемый период уменьшилось в 6,4 раза (от 174444 человек в 1999 г. до 27056 человек в 2015 г.), а также в 6,5 раза уменьшился показатель на 100 тыс. взрослого населения (от 120,2 в 1999 г. до 18,5 в 2015 г.).

У детей в возрасте 0–17 лет число заболевших гонореей уменьшилось в 7,6 раза (от 6,1 тысяч человек в 2005 г. до 0,8 тысяч человек в 2015 г.). У детей в возрасте 0–14 лет также отмечалось уменьшение числа заболевших с впервые в жизни установленным диагнозом на 79,6% (от 504 человек в 2005 г. до 103 человек в 2015 г.), а также снижение показателя на 100 тыс. населения соответствующего возраста на 83,3% (от 2,4 до 0,4). У детей в возрасте 15–17 лет отмечалось уменьшение числа заболевших впервые в жизни в 7,3 раза (от 5,1 тысяч человек в 2005 г. до 0,7 тысяч человек в 2015 г.), а также уменьшение показателя в 3,9 раза (от 73,8 до 18,2).

Среди заболевших гонококковой инфекцией с впервые в жизни установленным диагнозом число мужчин за анализируемый период уменьшилось на 65,3% (от 76648 человек в 2005 г. до 26558 человек в 2014 г.), в том числе на 100 тысяч мужского населения на 66,3% (от 116,2 до 39,2); а число женщин уменьшилось за этот же период на 69,1% (от 25150 человек в 2005 г. до 7770 человек в 2014 г.), в том числе на 100 тысяч женского населения – на 69,9% (от 32,9 до 9,9).

Среди мужчин больные гонококковой инфекцией в возрасте 0–14 лет в 2014 г. составляли 0,1%, 15–17 лет – 4,0%, 18–29 лет – 72,0%, 30–39 лет – 16,4%, 40 и более лет – 7,5%. Среди женщин в 2014 г. больных в возрасте 0–14 лет было 1,7%, 15–17 лет – 8,2%, 18–29 лет – 65,5%, 30–39 лет – 13,8%, 40 лет и старше – 10,8%.

Проведенный анализ заболеваемости, передаваемой половым путем, свидетельствует о значительном уменьшении числа больных, как с впервые установленным диагнозом, так и состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях по поводу сифилиса и гонококковой инфекции, что является безусловным достижением отечественной медицины в плане борьбы с распространением опасных венерических инфекций.

Список литературы

1. Информационный бюллетень ВОЗ «Глобальные стратегии профилактики инфекций, передаваемых половым путем, и борьба с ними». – 2016. – 70 с.
2. Статистический сборник «Здравоохранение в России». – 2015. – 130 с.