

Баландина Ирина Сергеевна
учитель математики высшей категории
МАОУ «Лицей №62»
г. Саратов, Саратовская область

О ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

Аннотация: математика всегда считалась одним из самых трудных предметов в школе. Действительно, нельзя усвоить знания по этому предмету без серьезных интеллектуальных усилий, нужно понимать и запоминать правила, держать эти знания в активной памяти на протяжении всего обучения в школе. Мы понимаем объективные трудности наших учеников. Изучение математики формирует не только логическое мышление, но и много других качеств человека: сообразительность, настойчивость, аккуратность, критичность и др. Прочтя задачу и ёщё не производя никаких действий, нужно стремиться к тому, чтобы научиться видеть, что тот или иной способ непригоден для её решения, а вот какой-то другой способ может быть использован. Такое умение вырабатывается в процессе решения одной и той же задачи разными способами. Именно поэтому часто полезнее решить одну и ту же задачу несколькими различными способами, чем решить три-четыре различные задачи. Речь пойдет о решении задачи с параметром для подготовки к ЕГЭ.

Ключевые слова: математика, ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ.

*Математику уже затем учитъ надо, что
она ум в порядок приводит.*

М.В. Ломоносов

Из русской народной сказки помним слова:

«Вперед поедешь – голову сложишь,
направо поедешь – коня потеряешь,
налево поедешь – меча лишишься».

Выбирать разные пути или варианты приходится и современному человеку. Прочтя задачу и ёщё не производя ни каких действий, нужно стремиться к тому,

чтобы научиться видеть, что тот или иной способ непригоден для её решения, а вот какой-то другой способ может быть использован. Такое умение вырабатывается в процессе решения одной и той же задачи разными способами. Именно поэтому часто полезнее решить одну и ту же задачу несколькими различными способами, чем решить три-четыре различные задачи. Речь пойдет о решении задачи с параметром для подготовки к ЕГЭ. Задачи с параметрами вызывают большие затруднения и у учащихся, и у учителей. Это связано с тем, что решение таких задач требует не только знания свойств функций и уравнений, но также высокой логической культуры и хорошей техники исследования.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2; \\ xy = a^2 - 3a \end{cases}$$

При каком значении a , система уравнений имеет 2 решения?

1 способ: аналитический

1. Пусть $a^2 - 3a = 0$; тогда $a(a - 3) = 0$;

$$\begin{cases} a = 0, \\ a = 3. \end{cases}$$

1.1. Если $a = 0$, то система уравнений примет вид

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 0; \\ xy = 0, \end{cases}$$

откуда получаем единственное решение $(0; 0)$. Так как нам надо 2 решения, то $a \neq 0$.

1.2. Если $a = 3$, то система уравнений примет вид

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9; \\ xy = 0, \end{cases}$$

откуда получаем 4 решения $(0; 3), (0; -3), (3; 0), (-3; 0)$. Так как нам надо 2 решения, то $a \neq 3$.

2. Пусть $a^2 - 3a \neq 0$; тогда $x \neq 0$ и сократим на x . Получим $y = \frac{a^2 - 3a}{x}$, подставим

в первое уравнение системы, $x^2 + \left(\frac{a^2 - 3a}{x}\right)^2 = a^2$; упростим $x^4 - a^2x^2 + (a^2 - 3a)^2 = 0$.

Это биквадратное уравнение, решаем с помощью замены, обозначим $x^2 = t$, $t^2 - a^2t + (a^2 - 3a)^2 = 0$;

Чтобы биквадратное уравнение имело 2 решения, надо чтобы квадратное имело либо один корень, либо два, но один положительный, а другой отрицательный. Если вспомнить теорему Виета, то так как произведение корней равно свободному члену, а это $(a^2 - 3a)^2$, то случая с одним положительным, а другим отрицательным быть не может, так как $(a^2 - 3a)^2 > 0$. Поэтому квадратное уравнение должно иметь один корень. Это возможно, если $D = 0$.

$$D = a^4 - 4(a^2 - 3a)^2 = 0;$$

$$(a^2 - 2(a^2 - 3a))(a^2 + 2(a^2 - 3a)) = 0;$$

$$a^2 = \pm 2(a^2 - 3a);$$

$$\left[\begin{array}{l} a^2 = 2(a^2 - 3a), \\ a^2 = -2(a^2 - 3a); \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{l} a^2 - 6a = 0, \\ 3a^2 - 6a = 0; \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{l} a = 6, \\ a = 2. \end{array} \right.$$

А случай $a = 0$ мы не рассматриваем (см п. 1), значит, при $a = 6$ и $a = 2$ $D = 0$.

Значит, квадратное уравнение имеет одно решение. Но надо, чтобы оно было еще и положительным. Проверим: при $a = 6$, $t^2 - 36t + 18^2 = 0$; $(t - 18)^2 = 0$; $t = 18 > 0$, при $a = 2$, $t^2 - 4t + 4 = 0$; $(t - 2)^2 = 0$; $t = 2 > 0$.

Ответ: при $a = 2$ и $a = 6$ система уравнений имеет 2 решения

2 способ: алгебраический

Применим формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, для этого второе уравнение системы умножим на 2 и сложим с первым, или из первого вычтем.

$$\begin{cases}
 \begin{cases}
 x^2 + y^2 = a^2, \\
 xy = a^2 - 3a;
 \end{cases} \\
 \begin{cases}
 x^2 + 2xy + y^2 = a^2 + 2a^2 - 6a, \\
 x^2 - 2xy + y^2 = a^2 - 2a^2 + 6a;
 \end{cases} \\
 \begin{cases}
 (x+y)^2 = 3a^2 - 6a, \geq 0 \\
 (x-y)^2 = -a^2 + 6a, \geq 0
 \end{cases} \\
 \begin{cases}
 x+y = \pm\sqrt{3a^2 - 6a}, \text{ пусть } \sqrt{3a^2 - 6a} = B, a\sqrt{-a^2 + 6a} = C, \text{ получим 4 решения:} \\
 x-y = \pm\sqrt{-a^2 + 6a}
 \end{cases}
 \end{cases}$$

$$\begin{cases}
 x+y = B, \\
 x-y = C;
 \end{cases}
 \begin{cases}
 x+y = B, \\
 x-y = -C;
 \end{cases}
 \begin{cases}
 x+y = -B, \\
 x-y = C;
 \end{cases}
 \begin{cases}
 x+y = -B, \\
 x-y = -C;
 \end{cases}$$

А надо по условию 2 решения. Какие-то две системы имеют одинаковые правые части.

1. Рассмотрим случай, когда $B = C = 0$, в этом случае 4 системы превращаются в одну. $\Rightarrow x = 0, y = 0$, одно решение нас не устраивает.

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Пусть } B = 0. \sqrt{3a^2 - 6a} = 0; \\
 3a^2 - 6a = 0; \\
 3a(a-2) = 0; \\
 \begin{cases}
 a = 0, \\
 a = 2
 \end{cases} \\
 a \neq 0. \Rightarrow a = 2, \text{ подставим в } \\
 \sqrt{-a^2 + 6a} = C, \Rightarrow \text{второе уравнение } \\
 \sqrt{-4 + 12} = \sqrt{8} \text{ существует и } C = \sqrt{8}. \\
 \begin{cases}
 x+y = 0, \\
 x-y = \sqrt{8};
 \end{cases} \\
 \begin{cases}
 x+y = 0, \\
 x-y = -\sqrt{8}.
 \end{cases}
 \end{aligned}$$

2. Рассмотрим случай $C = 0; \sqrt{-a^2 + 6a} = 0, -a^2 + 6a = 0, a(6-a) = 0$; т. к. $a \neq 0$. $\Rightarrow a = 6$, подставим в $\sqrt{3a^2 - 6a} = B$, проверим существует ли корень. $\sqrt{3 \cdot 36 - 36} = 6\sqrt{2} > 0$. Существует.

$$\begin{cases}
 x+y = 6\sqrt{2}, \\
 x-y = 0;
 \end{cases}
 \begin{cases}
 x+y = -6\sqrt{2}, \\
 x-y = 0.
 \end{cases}$$

У каждой из этих систем одно решение, значит, наша система при $a = 6$ имеет 2 решения.

У каждой из этих систем одно решение, значит, наша система при $a = 2$ имеет 2 решения.

Ответ: при $a = 2$ и $a = 6$ система уравнений имеет 2 решения

3 способ: тригонометрический

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2, \\ xy = a^2 - 3a \end{cases}$$

Если $a \neq 0$, сократим первое уравнение системы на a , получим:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{a}\right)^2 = 1, \quad (1)$$

ассоциации с единичной окружностью. $\frac{x}{a} = \cos \alpha$; $\frac{y}{a} = \sin \alpha$;

второе уравнение сократим на a , получим $\frac{x}{a} \frac{y}{a} = \frac{a^2 - 3a}{a^2}$ (2),

далее умножим обе части на 2; $2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2a^2 - 6a}{a^2}$,

получим формулу синуса двойного угла: $\sin 2\alpha = \frac{2a^2 - 6a}{a^2}$.

Пусть $\frac{2a^2 - 6a}{a^2} = b$, где $-1 \leq b \leq 1$

$$\begin{cases} 2\alpha = \arcsin b + 2\pi k, \\ 2\alpha = \pi - \arcsin b + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha = \frac{1}{2} \arcsin b + \pi k, \leftarrow 2 \text{ точки на окружности} \\ \alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \arcsin b + \pi k, k \in \mathbb{Z} \leftarrow 2 \text{ точки на окружности} \end{cases}$$

Надо всего 2 решения. а не 4. Пусть $b = 1$, т. к. $\sin 2\alpha = 1$, или $\sin 2\alpha = -1$

$$\begin{array}{ll} 1) \frac{2a^2 - 6a}{a^2} = 1; & 2) \frac{2a^2 - 6a}{a^2} = -1, \\ 2a^2 - 6a = a^2; & 2a^2 - 6a = -a^2; \\ a^2 - 6a = 0; & 3a^2 - 6a = 0; \\ a(a - 6) = 0; & 3a(a - 2) = 0; \\ \text{удовлетворяет только } a = 6 & \text{удовлетворяет только } a = 2 \end{array}$$

Ответ: при $a = 2$ и $a = 6$ система уравнений имеет 2 решения

4 способ: идея чётности

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2, \\ xy = a^2 - 3a \end{cases}$$

Если $(x; y)$, то $(y; x)$ тоже решение системы более того $(-x; -y)$ тоже решение.

Получаем четыре решения, что нас не устраивает, так как надо 2 решения. Это может быть, когда какие-то решения будут совпадать.

1) пусть $(x; y)$ и $(y; x)$ совпали. Это означает, что $x = y$

$$\begin{cases} x^2 + x^2 = a^2, \\ xx = a^2 - 3a; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x^2 = a^2, \\ x^2 = a^2 - 3a; * (-2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x^2 = a^2, \\ -2x^2 = -2a^2 + 6a; \text{ сложим} \end{cases}$$

$$-a^2 + 6a = 0;$$

$$a(a - 6) = 0;$$

$$a = 0 \text{ или } a = 6$$

При $a = 0$, $x = 0$, $y = 0$, не 2 решения, проверим, существуют ли решения при $a = 6$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 6^2, \\ xy = 6^2 - 3 * 6; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 36, \\ xy = 18; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + \left(\frac{18}{x}\right)^2 = 36 \\ y = \frac{18}{x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \pm\sqrt{18} \\ y = \pm\sqrt{18} \end{cases}$$

Значит, при $a = 6$ имеем 2 решения.

2) пусть $(x; y)$ и $(-y; -x)$ совпали. Это означает,

Что $x - y = -y - x$

$$\begin{cases} x^2 + x^2 = a^2, \\ -xx = a^2 - 3a; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x^2 = a^2, \\ -x^2 = a^2 - 3a; * (-2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x^2 = a^2, \\ 2x^2 = -2a^2 + 6a; \end{cases}$$

$$-2a^2 + 6a = a^2,$$

$$3a^2 - 6a = 0,$$

$$3a(a - 2) = 0;$$

$$a = 0 \text{ или } a = 2$$

Помним, что $a \neq 0$, проверим, существуют ли решения при $a = 2$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2^2, \\ xy = 2^2 - 3 * 2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ xy = -2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + \left(-\frac{2}{x}\right)^2 = 4 \\ y = -\frac{2}{x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \sqrt{2}, \\ y = -\sqrt{2}; \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x = -\sqrt{2}, \\ y = \sqrt{2}. \end{cases}$$

Значит, при $a = 2$ имеем 2 решения.

Ответ: при $a = 2$ и $a = 6$ система уравнений имеет 2 решения

5 СПОСОБ: графический

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2, \\ xy = a^2 - 3a \end{cases}$$

Система уравнений должна иметь 2 решения, значит окружность (1) и гипербола (2) могут иметь 2 точки пересечения при условии касания гиперболой окружности.